

CAUSAS CONOCIDAS DE SORDOCEGUERA			
Causas de sordoceguera adquirida a cualquier edad			
Anoxia, asfixia Traumatismos oculares /auditivos Encefalitis Infecciones oculares /auditivas Meningitis		Traumatismo cranoencefálico Ictus Tumores Agentes químicos Cirugía	
Complicaciones prenatales, que producen sordoceguera congénita			
A) Complicaciones específicas de la prematuridad: Retinopatía del prematuro + sordera neurosensorial o de otras causas.		B) No relacionadas con la prematuridad: Anoxia Rubéola Sífilis Toxoplasmosis Citomegalovirus Síndrome alcohólico fetal Hidrocefalia Microcefalia Teratogenia Herpes neonatal	
Síndromes que producen sordoceguera, generalmente adquirida			
A) Suelen producir sordoceguera Usher tipo I Usher tipo II Usher tipo III Usher, otros tipos		B) Pueden producir sordoceguera Neurofibromatosis (NF1, enf. de von Recklinghausen) Neurofibromatosis Bilateral Acústica (NF2) Wolfram (DIDMOAD)	
Síndromes que pueden producir sordoceguera, generalmente congénita.			
Aicardi	Patau (trisomía 13-15)	Klippel-Trenaunay-Weber	Pfieffer
Alport	Crouzon (Disotosis Craneofacial)	Kniest (displasia de)	Prader-Willi
Alstrom	Dandy Walker	Leber (amaurosis congénita de)	Pierre-Robin
Apert (Acrocephalosyndactylia, Tipo 1)	Down (Trisomía 21)	Leigh (enfermedad de)	Refsum
Bardet-Biedl (Laurence Moon-Biedl)	Edwards (Trisomía 18)	Marfan	Scheie (MPS I-S)
Batten	Goldenhar	Marshall	Smith-Lemli-Opitz (SLO)
CHARGE	Hand-Schuller-Christian (Histiocitosis X)	Maroteaux-Lamy (MPS VI)	Stickler
Cromosoma 18	Hallgren	Moebius	Sturge-Weber
Cockayne	Herpes-Zoster (Hunt)	Monosomía 10p	Treacher Collins
Cogan	Hunter (MPS II)	Morquio (MPS IV-B)	Turner
Cornelia de Lange	Hurler (MPS I-H)	Norrie	Vogt-Koyanagi-Harada
Cri du chat (Cromosoma 5p)	Kearns-Sayre	Optico-Cochleo-Dentate	Waardenburg
Crigler-Najjar	Klippel-Feil		Wildervanck
			Wolf-Hirschhorn (trisomía 4p)
			Zellweger

Revisado por :

Dr Juan C. García Rubira, MD, PhD. APASCIDE. 2007.